

COMPANHIA DE VACINAÇÃO COVID-19

DVVPI - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE



Intervalo entre as doses das vacinas COVID

Atenção para o aprazamento entre as doses D1 e D2

- ❖ Vacina Coronavac/Butantan: intervalo de 25 dias
- ❖ Astrazeneca/Fiocruz: intervalo de 3 meses
- ❖ Vacina Pfizer BioNtech – Cominarty – **intervalo de 3 meses**
- ❖ Vacina Janssen – **dose única**



Vacinas Janssen contra a COVID-19



Laboratório fornecedor: Janssen Cilag

Indicação de uso: Pessoas com idade igual ou maior a 18 anos

Forma farmacêutica: Suspensão injetável

A suspensão é incolor a ligeiramente amarela, límpida a muito opalescente

Via de administração: IM (intramuscular) no músculo deltóide

Esquema vacinal: Dose única de 0,5 ml

Prazo de validade refrigerada de 2° a 8°C: 03 meses

Validade após abertura do frasco: 06 horas em temperatura de 2° a 8°C

Vacinas Janssen contra a COVID-19




- A vacina já vem pronta para utilizar
 - NÃO congelar
 - Armazenar de 2º a 8ºC
 - Manter longe da luz direta
- NÃO utilizar mais que **5 doses** do frasco multidose

A vacina deve ser inspecionada visualmente para a detecção de partículas e descoloração antes da administração

Apresentando anomalias, NÃO aplicar a vacina e realizar a notificação no NOTIVISA


Vacina Janssen contra a COVID-19

Preparação e administração da vacina



Faça movimentos circulares suaves

- Antes de administrar uma dose da vacina, faça um movimento circular suave na posição vertical durante 10 segundos.
- Não agitar.



Retire 0,5 ml

- Utilize uma agulha e seringa esterilizadas para extrair uma dose única de 0,5 ml do frasco para injetáveis multidose (ver secção 4.2).



Administre 0,5 ml

- Administrar apenas por injeção intramuscular no músculo deltoide do braço (ver secção 4.2).

⚠ Podem ser retiradas um máximo de 5 doses do frasco para injetáveis multidose. Após as 5 doses terem sido extraídas, elimine qualquer conteúdo da vacina restante no frasco para injetáveis.

Logística e distribuição das doses das Janssen Covid-19


- ❖ As vacinas serão distribuídas de **forma proporcional aos 399 municípios**
- ❖ **Deverão ser aplicadas em tempo OPORTUNO – validade de 4,5 meses**



Todo o processo de distribuição ocorre em menos de 24 horas e todas as etapas são registradas no SIES (*), para controle de estoque e movimentação de imunobiológicos em todas instâncias.

(*) SIES- Sistema de Insumos Estratégicos

Armazenamento das doses das vacinas Janssen



**Embalagem: CARTUCHOS COM 10 FRASCOS
CADA FRASCO COM 5 DOSES DE 0,5 ml**

Armazenamento das vacinas Janssen

PRODUTO TERMOLÁBIL

Todo o transporte e manuseio deverá estar na faixa de temperatura de **2°C a 8°C**.



Doação de Sangue pós vacina contra COVID-19

Vacina	Laboratório	Tecnologia	Inaptidão para doação de sangue
Coronavac	Sinovac/Butantan	Vírus inativado	48 horas
Comirnaty / Pfizer	Pfizer	RNA mensageiro	7 dias
Janssen	Janssen-Cilag	Vetor viral	7 dias
AstraZeneca	Fiocruz/Oxford/AstraZeneca	Vetor viral	7 dias

NOTA TÉCNICA Nº 12/2021/SEI/GSTCO/DIRE1/ANVISA
MEMO CIRC. Nº 99/2021 – DVVPI/CVIE/DAV

Fluxo de solicitação de seringas

- **Padronização**
- **Solicitações de seringas e agulhas**
- **Estratégias**
 - Rotina**
 - Campanhas**
- **Regionais de Saúde**
- **Municípios**


Fluxo de solicitação de seringas

Anexo I – Solicitação de Seringas e Agulhas no SIES

01. **Selecionar a área** – após fazer o login no sistema escolher a área em qual o insumo a ser solicitado faz parte. Tratando-se de seringa sempre será selecionado a opção “INSUMOS DIVERSOS”.



Figura 01. Fluxo de Solicitação de Seringas e Agulhas





Grandes batalhas
só são dadas a
grandes guerreiros.

frasesdobem

**Agradecemos muito a
vocês por todo o empenho!**

**Não esta sendo fácil, mas
vamos persistir, estamos
no caminho certo!**

